

Показатели мочи и крови, дифференцирующие основные заболевания почек
(Ниманд, 1980)

Таблица 8

Показатели	Острый нефрит	Хронический нефрит	Нефроз	Нефротический синдром	Уремия
		МО ЧА			
Удельный вес	Высокий (1030-1040)	Нормальный или низкий	Высокий	Нормальный или низкий	Ниже 1010
Протеин	+ до +++	(+) до ++	++ до +++	+++	(+) до +
Эпителий	+ до +++	+ до ++	- или +	- или +	- или +
Лейкоциты	+ до +++	- или ++	-	-	- или (+)
Эритроциты	+ до +++	- или (+)	-	-	-
Цилиндры	+ до +++	- или +	-	+ до +++	-
		КРО ВЬ			
СОЭ	+ до ++	- или +	-	- или ++ (анемия)	+ до +++ (анемия)
Гематокрит	-	- или понижен	-	- или понижен	Сильно понижен
Лейкоциты	+ до ++	- или +	-	-	-
Мочевина	+ до ++	- или ++	очень долго -, а в конце + до ++	+ до ++	+++
Холестерин	-	-	- или понижен	+ до +++	Понижен
Креатинин	-	-	- или понижен	+ до +++	++ до +++
Основные симптомы	Температура, бурная рвота	Полидипсия, полиурия	Отеки, асцит, гипопроteinемия гипоальбуминемия	Отеки, асцит	Анемия запах мочи из пасти апатия, дегидратация